



HORTUS BOTANICUS

Журнал Совета ботанических садов СНГ при МААН

12 / 2017

HORTUS BOTANICUS

Журнал Совета ботанических садов СНГ при МААН

12 / 2017

ISSN 1994-3849
Эл № ФС 77-33059 от 11.09.2008

Главный редактор
А. А. Прохоров

Редакционный совет

П. Вайс Джексон
А. С. Демидов
Т. С. Маммадов
В. Н. Решетников
Т. М. Черевченко

Редакционная коллегия

Г. С. Антипина
Е. М. Арнаутова
А. В. Бобров
Ю. К. Виноградова
Е. В. Голосова
Ю. Н. Карпун
В. Я. Кузеванов
Е. Ф. Марковская
Ю. В. Наумцев
Е. В. Спиридович
К. Г. Ткаченко
А. И. Шмаков

Редакция

А. В. Еглачева
С. М. Кузьменкова
К. О. Романова
А. Г. Марахтанов

Адрес редакции

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Анохина, 20, каб. 408.

E-mail:hortbot@gmail.com
<http://hb.karelia.ru>

© 2001 - 2017 А. А. Прохоров

На обложке:

Оранжереи Главного ботанического сада им. Н. В. Ццина Российской Академии Наук

Разработка и техническая поддержка

Отдел объединенной редакции научных журналов ПетрГУ, РЦ НИТ ПетрГУ,
Ботанический сад ПетрГУ

Петрозаводск
2017

Формирование коллекции многолетних травянистых североамериканских представителей семейства *Asteraceae* в Главном ботаническом саду РАН

КАБАНОВ
Александр Владимирович

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук,
ул. Ботаническая, 4, Москва, 127276, Россия
alex.kabanow@rambler.ru

Ключевые слова:
обзор, интродукция,
Asteraceae, флора Северной Америки, природные виды, сорта

Аннотация: Интродукция многолетних североамериканских представителей семейства *Asteraceae* Bercht. & J. Presl в ГБС РАН ведется с 1946 г. За это время был изучен комплекс, включающий 22 рода и 65 видов. В настоящее время интродукционная работа продолжается. При этом в НИР включены как широко распространенные роды и виды, так и мало известные в культурной флоре России североамериканские представители этого семейства. Длительный период интродукционных исследований позволил выявить наиболее устойчивые в условиях культуры виды. Итогом многолетней работы стало создание родовых комплексов, некоторые из которых презентативно представляют генетическое разнообразие по отдельным культурам.

Получена: 21 февраля 2017 года

Подписана к печати: 08 июля 2017 года

Введение

Семейство астровые (*Asteraceae* Bercht. & J. Presl) – одно из самых больших семейств, его представители распространены практически по всему Земному шару. Значительный объем занимают представители этого семейства во флоре Северной Америки, где представлено 418 родов и 2413 видов (*Flora of North America*, v. 19, 2006).

Представители североамериканской флоры традиционно входят в коллекционный фонд Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН (ГБС РАН). Травянистые многолетние виды флоры Северной Америки умеренного климата представлены в коллекциях Отдела декоративных растений с момента его основания в 1946 г. Однако стоит отметить, что длительность нахождения в составе коллекционного фонда образцов и их таксономический состав значительно варьируют.

Интродукционное изучение североамериканских представителей семейства астровые способствует расширению культурной флоры Средней полосы России, ведь до сих пор многие роды не проходили интродукционного испытания. В то же время среди родов, отдельные представители которых уже прошли интродукционное испытание, достаточно много потенциально перспективных для интродукции видов, пока еще не представленных в коллекционном фонде. При этом особое внимание при интродукции в настоящее время уделяется поздноцветущим представителям данного семейства.

Основная часть

Интродукционное изучение представителей семейства *Asteraceae* Bercht. & J. Presl флоры Северной Америки в ГБС РАН проводится с 1946 г. (Декоративные многолетники, 1960). Первые образцы поступили из Германии в 1946–1947 гг. В это время был получен уникальный комплекс, состоящий как из природных видов (16 родов, представленных 33 природными видами), так и культурных форм (*Erigeron speciosus* DC. – 3 сорта; *Helenium autumnale* L. – 20 сортов; *Helopsis scabra* Dun. – 5 сортов; *Solidago canadensis* L. – 10 сортов; *Sympyotrichum dumosum* (L.) G. L. Nesom – 7 сортов; *Sympyotrichum ericoides* (L.) G. L. Nesom – 4 сорта; *Sympyotrichum novae-angliae* (L.) G. L. Nesom – 5 сортов; *Sympyotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom – 18 сортов). Этот набор сортов позволял представить основные тенденции в селекции данных культур.

В дальнейшем формирование коллекции осуществляли за счет обмена семенами и живыми растениями между ботаническими садами, а так же экспедиций, регулярно проводившихся в США в 1976–1985 гг. (Лапин, Некрасов, 1986).

В 1980-е гг. коллекционный фонд представителей семейства *Asteraceae* североамериканской флоры значительно сократился (Цветочно-декоративные травянистые растения, 1983). Снижение было отмечено как по природным видам, так и по сортам ряда культур (*Sympyotrichum novae-angliae* (L.) G. L. Nesom, *Sympyotrichum novi-belgii* (L.) G. L. Nesom, *Sympyotrichum ericoides* (L.) G. L. Nesom – сортовые коллекции полностью утрачены, *Sympyotrichum dumosum* (L.) G. L. Nesom – в коллекции осталось 3 сорта). Однако в этот период в коллекционный фонд были включены ранее не входившие в его состав природные виды, полученные из экспедиционных сборов: *Erigeron peregrinus* (Banks ex Pursh) Greene, *Eriophyllum lanatum* (Pursh) Forbes, *Helenium bigelovii* A. Gray, *Oreostemma alpigenum* (Torr. & A. Gray) Greene, *Rudbeckia occidentalis* Nutt. Однако в коллекциях они числились очень ограниченный период времени.

В дальнейшем тенденция сокращения коллекционного фонда продолжалась (Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии, 1997; Каталог растений Главного ботанического сада, 2001).

В настоящее время пополнение коллекции природных видов осуществляется на базе системы межботанического обмена делектусами, а сорта приобретены в питомниках России и Западной Европы или переданы из частных коллекций. Это позволило не только значительно увеличить коллекционный фонд, восстановив утраченные ранее основные роды и виды, но и существенно увеличить число новых, ранее не изученных североамериканских представителей семейства *Asteraceae* в ГБС РАН.

Так, по данным на конец 2016 года, в коллекцию входит 20 родов, представленных 43 природными видами, а так же репрезентативные собрания сортов по отдельным культурам.

Значительный объем в коллекции занимают представители, ранее относившиеся к роду *Aster* L. – рода *Doellingeria* Nees, *Eurybia* Cassini и *Sympyotrichum* (Nees) A. G. Jones (*Flora of North America*, v. 20, 2006). В последние годы коллекция осеннецветущих североамериканских представителей этих родов значительно пополнена (Кабанов, 2014) и, в настоящий момент, насчитывает 45 сортов и 10 природных видов. Многие сорта ранее в условиях Средней России не испытывали (Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии, 1997).

В настоящее время проводится планомерная работа по привлечению новых для Средней полосы России родов и видов, относящихся к семейству *Asteraceae*. Очень

перспективными для условий региона являются роды, характерные для флоры Северной Америки: *Boltonia* L'Her., *Eutrochium* Raf., *Helianthus* L., *Vernonia* Schreb., *Coreopsis* L., *Solidago* L., *Ageratina* Spach, *Silphium* L.

Эти роды в коллекции представлены как единичными видами, так и достаточно репрезентативно. Роды *Boltonia* L'Her., *Liatris* Gaertn. ex Schreb., *Eriophyllum* Lag. и *Silphium* L. в настоящее время представлены единичными видами - *Boltonia asteroides* (L.) L'Her., *Liatris spicata* (L.) Willd., *Eriophyllum lanatum* (Pursh) Forbes и *Silphium perfoliatum* L. Соответственно остальные роды представлены более значительным количеством видов. Так, в коллекцию рода *Helianthus* L. входят 3 вида: *Helianthus decapetalus* L. (в том числе и сорта 'Capenoch Star', 'Solei d'Or'), *Helianthus mollis* Lam. и *Helianthus microcephalus* Torr. & A. Gray.

Среди представителей рода *Coreopsis* L., давно входящих в коллекционные фонды – наиболее распространен в ботанических садах малолетний вид *Coreopsis grandiflora* T. Hogg ex Sweet (Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии, 1997; RHS Plant Finder, 2012), на протяжении практически всего периода интродукционных исследований он входил в коллекционный фонд. Но особый интерес представляет недавно введенный в коллекцию *Coreopsis tripteris* L. – перспективный поздноцветущий высокорослый многолетник.

Перспективно и дальнейшее интродукционное изучение рода *Solidago* L., представленного в коллекции достаточно многочисленным комплексом сортов *Solidago x hybrida* hort. В настоящее время интродукционное испытание проходят 3 природных вида - *Solidago rigida* L., *Solidago flexicaulis* L., *Solidago caesia* L. и *Euthamia graminifolia* (L.) Nutt., ранее также относившаяся к этому роду (Flora of North America, v. 20, 2006). Стоит отметить, что все исследуемые виды достаточно декоративны и перспективны в условиях Средней полосы России.

Продолжается активное привлечение и сортов *Helenium autumnale* L., помимо природного вида в коллекцию входят 8 сортов ('Hot Lava', 'Kupferzwerg', 'Moerheimii Beauty', 'Red Army', 'Red Jewel', 'Rubinzwerg', 'Tie Dye', 'Waltraut').

Род *Echinacea* Moench в коллекции представлен 2 природными видами - *Echinacea purpurea* (L.) Moench и *Echinacea angustifolia* DC. и 18 сортами, полученными на их основе ('Green Envy', 'Hot Papaya', 'Marmalade' – от *Echinacea angustifolia*; 'Catharina', 'Coconut Lime', 'Green', 'Jade', 'Meringue', 'Pink Double Delight', 'Prairie Splendor', 'Secret Joy', 'Secret Passion', 'Secret Romanse', 'Southern Belle', 'The King', 'Virgin', 'White Double Delight' – на основе *Echinacea purpurea*). Стоит отметить, что значительная часть сортов – малолетние растения. Поэтому за время интродукционного испытания отмечена быстрая смена сортового состава представителей данного рода.

В современной коллекции также активно формируется и родовой комплекс *Rudbeckia* L., представленный 6 природными видами, принадлежащими к 2 секциям этого рода (Flora of North America, v. 21, 2006). Секция *Rudbeckia* Linnaeus sect. *Macrocline* Torrey & A. Gray представлена 4 видами: *Rudbeckia laciniata* L., *Rudbeckia maxima* Nutt., *Rudbeckia occidentalis* Nutt. и *Rudbeckia nitida* Nutt. Секция *Rudbeckia* Linnaeus sect. *Rudbeckia* представлена 2 видами - *Rudbeckia fulgida* Aiton и *Rudbeckia triloba* L.

В настоящее время особое внимание уделено интродукционному изучению представителей рода *Vernonia* Schreb. - в коллекционный фонд входит лишь один вид - *Vernonia arkansana* DC. (syn. *Vernonia crinita* Raf.), однако в первичном интродукционном испытании находятся еще 3 вида (*Vernonia glauca* (L.) Willd., *Vernonia fasciculata* Michx. и *Vernonia gigantea* (Walter) Trel.). Особенностью верноний в условиях Средней полосы России является позднее цветение. Неприхотливость и долговечность позволяет говорить об их

перспективности для введения в культурную флору.

Репрезентативно представлен в коллекции и комплекс видов, ранее относившийся к роду *Eupatorium* L. (*Flora of North America*, v. 21, 2006). Он включает такие роды как *Ageratina* Spach и *Eutrochium* Raf. Помимо природных видов - *Eutrochium dubium* (Willd. ex Poir.) E. E. Lamont, *Eutrochium fistulosum* (Barratt) E. E. Lamont, *Eutrochium maculatum* (L.) E. E. Lamont, *Eutrochium purpureum* (L.) E. E. Lamont, *Ageratina altissima* (L.) King & H. E. Robins., *Ageratina aromatica* (L.) Spach в коллекции представлены и сорта, полученные на их основе – ‘Little Joe’ (*Eutrochium dubium*), ‘Atropurpureum’ и ‘Phantom’ (*Eutrochium maculatum*), ‘Album’ (*Eutrochium purpureum*).

За многолетний (1946–2016 гг.) период интродукционных исследований в Отделе декоративных растений ГБС РАН было привлечено 22 рода и 65 видов североамериканских представителей семейства *Asteraceae*, которые были включены в коллекционный фонд. Динамика формирования коллекционного фонда представлена в таблице 1.

Из представленного списка таблицы видно, что только немногие виды в течении исследуемого периода времени были представлены в коллекционном фонде: *Eutrochium purpureum* (L.) E. E. Lamont, *Helenium autumnale* L., *Hymenoxys hoopesii* (A. Gray) Bierner, *Liatris spicata* (L.) Willd. Число видов, стабильно поддерживаемых в коллекциях в течение 15 последних лет значительно больше: *Ageratina altissima* (L.) King & H. E. Robins., *Echinacea purpurea* Moench., *Eurybia divaricata* (L.) G. L. Nesom, *Gaillardia aristata* Pursh, *Helopsis scabra* Dun., *Rudbeckia fulgida* Aiton, *Rudbeckia laciniata* L., *Symphyotrichum dumosum* (L.) G. L. Nesom, *Symphyotrichum ericoides* (L.) G. L. Nesom. Среди указанных видов встречаются и малолетние растения, нуждающиеся в регулярном делении (*Echinacea purpurea* Moench.) или пересеве (*Gaillardia aristata* Pursh). Остальные же указанные виды оказались достаточно устойчивыми долголетними растениями в условиях Средней полосы России.

Таблица 1. Наличие представителей семейства *Asteraceae* Северной Америки в составе коллекционного фонда Отдела декоративных растений ГБС РАН.

Table 1. Presence of representatives of the *Asteraceae* family of North America as part of the collection of the Department of Ornamental Plants of the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences.

Представитель	1960 1	1973 2	1983 3	1997 4	2001 5	2009 6	2016 7
<i>Ageratina altissima</i> (L.) King & H. E. Robins. (<i>Eupatorium rugosum</i> Houtt.)	-	-	-	-	+	+	+
<i>Ageratina aromatica</i> (L.) Spach (<i>Eupatorium aromaticum</i> L.)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Boltonia asteroides</i> (L.) L'Her.	-	-	-	-	-	-	+
<i>Boltonia latisquamata</i> A. Gray	+	-	-	-	-	-	-
<i>Coreopsis grandiflora</i> Nutt.	+	-	+	+	-	+	+

<i>Coreopsis lanceolata</i> L.	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Coreopsis tripteris</i> L.	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Coreopsis verticillata</i> L.	+	+	+	+	-	+	-	-
<i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees (Aster <i>umbellatus</i> Mill.)	-	+	-	-	-	-	-	+
<i>Echinacea angustifolia</i> DC.	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Echinacea pallida</i> (Nutt.) Nutt.	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Echinacea purpurea</i> Moench.	+	-	+	-	+	+	+	+
<i>Eurybia divaricata</i> (L.) G. L. Nesom (Aster <i>divaricatus</i> L.)	-	-	-	-	+	+	+	+
<i>Eurybia macrophylla</i> (L.) Cass. (Aster <i>macrophyllus</i> L.)	+	+	-	-	-	-	-	+
<i>Erigeron peregrinus</i> (Banks ex Pursh) Greene	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Erigeron speciosus</i> DC.	+	+	+	+	+	-	-	-
<i>Eriophyllum lanatum</i> (Purch) Forbes	-	-	+	-	-	+	+	+
<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. (Solidago <i>graminifolia</i> Salisb.)	+	-	-	-	-	-	-	+
<i>Eutrochium dubium</i> (Willd. ex Poir.) E. E. Lamont (Eupatorium <i>dubium</i> Willd. ex Poir.)	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Eutrochium fistulosum</i> (Barratt) E. E. Lamont (Eupatorium <i>fistulosum</i> Barratt)	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Eutrochium maculatum</i> (L.) E. E. Lamont (Eupatorium <i>maculatum</i> L.)	-	-	-	-	-	-	-	+

<i>Eutrochium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>purpureum</i> (L.) E. E. Lamont (<i>Eupatorium</i> <i>purpureum</i> L.)								
<i>Gaillardia</i>	+	-	+	+	+	+	+	+
<i>aristata</i> Pursh								
<i>Helenium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>autumnale</i> L.								
<i>Helenium bigelovii</i> A. Gray	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Helenium</i>	+	+	+	+	-	-	-	-
<i>pumilum</i> Willd.								
<i>Helianthus</i>	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>decapetalus</i> L.								
<i>Helianthus</i>	+	+	+	-	+	+	+	-
<i>giganteus</i> L.								
<i>Helianthus</i>	+	+	+	-	-	-	-	+
<i>microcephalus</i> Torz. et Gr.								
<i>Helianthus</i>	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>mollis</i> Lam.								
<i>Helianthus</i>	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>scaberrimus</i> Ell.								
<i>Helianthus</i>	+	+	+	-	+	+	+	+
<i>scabra</i> Dun.								
<i>Hymenoxys</i>	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>hoopesii</i> (A. Gray) Bierner (<i>Helenium</i> <i>hoopesii</i> A. Gray)								
<i>Liatris aspera</i> Michx.	-	-	-	+	+	-	-	-
<i>Liatris</i>	-	-	-	-	+	-	-	-
<i>pycnostachya</i> Michx.								
<i>Liatris scariosa</i> (L.)	+	-	-	-	+	-	-	-
Willd.								
<i>Liatris spicata</i> (L.)	+	+	+	+	+	+	+	+
Willd.								
<i>Liatris squarrosa</i> (L.)	-	-	-	-	+	-	-	-
Michx.								
<i>Oreostemma</i>	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>alpigenum</i> (Torr. & A. Gray) Greene (<i>Aster</i> <i>alpigenus</i> (Torr. & A. Gray)								
<i>Rudbeckia</i>	+	-	-	-	+	+	+	+
<i>fulgida</i> Aiton								
<i>Rudbeckia</i>	+	+	+	-	+	+	+	+
<i>laciniata</i> L.								
<i>Rudbeckia</i>	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>maxima</i> Nutt.								

<i>Rudbeckia nitida</i> Nutt.	+	-	-	-	-	+	+
<i>Rudbeckia occidentalis</i> Nutt.	-	-	+	-	-	-	+
<i>Rudbeckia serotina</i> Nutt.	-	-	+	+	-	-	-
<i>Rudbeckia speciosa</i> Wenderoth.	+	+	+	-	+	+	-
<i>Rudbeckia triloba</i> L.	-	-	-	-	-	-	+
<i>Silphium perfoliatum</i> L.	-	-	-	-	-	+	+
<i>Solidago altissima</i> L.	+	+	+	-	-	+	-
<i>Solidago caesia</i> L.	-	-	-	-	-	-	+
<i>Solidago canadensis</i> L.	+	+	+	+	+	+	-
<i>Solidago flexicaulis</i> L.	-	-	-	-	-	-	+
<i>Solidago missouriensis</i> Nutt.	-	-	-	-	+	-	-
<i>Solidago ptarmicoides</i> (Torr. & A. Gray) B. Boivin (<i>Aster ptarmicoides</i> Torr. et A. Gray)	+	+	-	-	-	-	-
<i>Solidago rigida</i> L.	-	-	-	-	-	-	+
<i>Solidago rugosa</i> Mill.	+	+	+	+	-	-	+
<i>Solidago shortii</i> Torr. & Gray	+	+	+	+	-	-	-
<i>Symphyotrichum cordifolium</i> (L.) G. L. Nesom (<i>Aster cordifolius</i> L.)	+	-	-	-	-	-	+
<i>Symphyotrichum dumosum</i> (L.) G. L. Nesom (<i>Aster dumosus</i> L.)	+	+	+	-	+	+	+
<i>Symphyotrichum ericoides</i> (L.) G. L. Nesom (<i>Aster ericoides</i> L.)	+	+	+	-	+	+	+
<i>Symphyotrichum laeve</i> (L.) A. & D. Löve (<i>Aster laevis</i> L.)	-	-	-	-	-	-	+
<i>Symphyotrichum lateriflorum</i> (L.) A. & D. Löve (<i>Aster lateriflorus</i> (L.) Britton)	-	-	-	-	-	-	+

<i>Symphyotrichum</i>	+	+	-	-	-	+	+
<i>novaes-angliae</i> (L.) G.							
L. Nesom (<i>Aster</i>							
<i>novaes-angliae</i> L.)							
<i>Symphyotrichum</i>	+	+	-	-	-	+	+
<i>novi-belgii</i> (L.) G. L.							
Nesom (<i>Aster novi-</i>							
<i>belgii</i> L.)							
<i>Vernonia</i>	-	-	-	-	-	-	+
<i>arkansana</i> DC.							
(<i>Vernonia</i>							
<i>crinita</i> Raf.)							

1 - по данным книги «Декоративные многолетники (краткие итоги интродукции)». М.: Изд-во АН СССР, 1960. – включены данные с 1946 по 1959 г.

2 - по данным Журнала фенологических наблюдений за 1973 г.

3 - по данным книги «Цветочно-декоративные травянистые растения (краткие итоги интродукции)». М.: «Наука», 1983. Так как в ней представлены неполные данные по состоянию коллекционных фондов, были использованы данные Журнала фенологических наблюдений за 1981-1982 гг.

4 - по данным книги «Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии». Минск: Изд. Э. С. Гальперин, 1997.

5 - по данным книги «Каталог растений Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук». М.: Изд-во МСХА, 2001., использованы данные только по Отделу декоративных растений.

6 - по данным книги «Травянистые декоративные многолетники Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН: 60 лет интродукции». М.: Наука, 2009.

7 - по данным списка коллекционного фонда Отдела декоративных растений за 2016 г.

Долгое время набор родов семейства *Asteraceae* Отдела декоративных растений в целом оставался стандартным, включая широко распространенные в коллекциях других ботанических садов таксоны. Однако в коллекциях ГБС РАН были проведены интродукционные исследования достаточного числа природных видов. В итоге была получена информация об особенностях их культивирования в условиях Средней полосы России. Так, из 37 видов рода *Liatris* Gaern. ex Schreb., в коллекции было испытано 5 видов; из 23 видов рода *Rudbeckia* L. (Flora of North America, v. 21, 2006) – испытано 7 видов (при этом учитывались только многолетние и малолетние виды); из 5–7 видов рода *Eutrochium* Raf. (Flora of North America, v. 21, 2006) – испытано 4 вида и т.д. В итоге в коллекции удалось изучить (*Liatris* Gaern. ex Schreb., *Coreopsis* L., *Solidago* L.), а в ряде случаев и сохранить (*Eutrochium* Raf., *Symphyotrichum* (Nees) A. G. Jones., значительную часть представителей *Rudbeckia* L.) уникальные родовые комплексы.

В настоящее время в Отделе декоративных растений ГБС РАН начата работа по расширению присутствия перспективных для включения в культурную флору родовых комплексов *Vernonia* Schreb., *Ageratina* Spach, *Helianthus* L. и *Silphium* L.

Однако необходимо привлекать в интродукционные исследования и новые для коллекции виды. Это связано с тем, что, в целом, флора Северной Америки в настоящее время недостаточно представлена в коллекционном фонде. Хотя потенциал доноров для введения в культуру значителен. Многие роды не проходили интродукционного испытания в ГБС РАН. Перспектива использования североамериканских поздноцветущих представителей семейства *Asteraceae* связана с тем, что, несмотря на более теплый климат и значительно больший вегетационный период, многие регионы, в первую очередь США, могут быть местами наибольшего интродукционного интереса. Так, наибольшее число перспективных видов, уже прошедших интродукционное изучение в условиях Средней полосы России приурочено к таким географическим районам как Аппалачские горы, североамериканские прерии и Скалистые горы (Радионова, 2003). Часто при выборе

североамериканских регионов-доноров ограничиваются только северными, северо-западными и северо-восточными штатами США, отличающимися умеренно-континентальным климатом, устойчивым снежным покровом и достаточным увлажнением, растительность которых представлена хвойно-широколиственными и широколиственными лесами, высокотравными и низкотравными прериями, равнинными и альпийскими лугами, а так же скальными сообществами. Однако и более южные штаты могут стать регионами-донорами (Лапин и др., 1986) в том случае, если за основу брать интродукцию растений из субальпийского пояса.

Заключение

За все время интродукционных исследований (с 1946 г.) в Отделе декоративных растений ГБС РАН было изучено 22 рода и 65 видов североамериканских представителей семейства Asteraceae Bercht. & J. Presl. Коллекционный фонд представителей данного семейства за время интродукционного изучения значительно изменился. Однако ряд видов был представлен в коллекции в течение всего периода интродукции: *Eutrochium purpureum* (L.) E. E. Lamont, *Helenium autumnale* L., *Hymenoxys hoopesii* (A. Gray) Bierner, *Liatris spicata* (L.) Willd. Интродукционный потенциал североамериканской флоры до сих пор не исчерпан. Многие роды в коллекции ни разу не испытывались. Необходимо так же расширить и географию регионов-доноров, в том числе и за счет более южных штатов.

Литература

Декоративные многолетники (краткие итоги интродукции). М.: Изд-во АН СССР, 1960. 333 с.

Кабанов А. В. Перспективные поздноцветущие представители семейства астровые в коллекциях отдела декоративных растений Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН // Субтропическое и декоративное садоводство: сб. научн. тр. Сочи: ВНИИЦиСК, 2014. Вып. 50. С. 96—100.

Каталог растений Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук. М.: Изд-во МСХА, 2001. 347 с.

Каталог цветочно-декоративных травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии. Минск: Изд. Э. С. Гальперин, 1997. 476 с.

Лапин П. И., Некрасов В. И., Плотникова Л. С., Скворцов А. К., Элайс Т. С. Интродукция и охрана растений в СССР и США. М.: Наука, 1986. 128 с.

Радионова Е. С. Растительный покров Северной Америки как источник интродукции декоративных травянистых многолетников в Средней полосе России. // Автореф. канд. дис. М., 2003. 22 с.

Травянистые декоративные многолетники Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН: 60 лет интродукции. М.: Наука, 2009. 396 с.

Цветочно-декоративные травянистые растения (краткие итоги интродукции). М.: «Наука», 1983. 272 с.

Flora of North America: Volume 19: Magnoliophyta: Asteridae, Part 6: Asteraceae, Part 1. Oxford University Press, 2006. 610 p.

Flora of North America: Volume 20: Magnoliophyta: Asteridae, Part 7: Asteraceae, Part 2. Oxford University Press, 2006. 690 p.

Flora of North America: Volume 21: Magnoliophyta: Asteridae, Part 8: Asteraceae, Part 3. Oxford

University Press, 2006. 642 p.

RHS Plant Finder 2012 – 2013. Royal Horticultural Society, London, 2012. 926 p.

Formation of the collection of perennial herbaceous North American representatives of the aster family in the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences

KABANOV
Alexander Vladimirovich

Maine Botanical Garden to them. NV Tsitsi Russian Academy of Sciences,
Botanicheskaya, 4, Moscow, 127276, Russia
alex.kabanow@rambler.ru

Key words:
review, introduction, Asteraceae,
Flora of North America, natural
species, varieties

Summary: Introduction of perennial North American representatives of Asteraceae Bercht. & J. Presl family in the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences has been carried out since 1946. During this time, a set of 22 genera and 65 species has been studied. At the moment, introductory work is in progress. The research paper includes both widespread genera and species, and little-known representatives of the North American family in the cultural flora of Russia. A long period of research revealed the most resistant plant species. The result of the work was genetic complexes creation, some of them represent genetic diversity of certain cultures.

Is received: 21 february 2017 year

Is passed for the press: 08 july 2017 year

References

Dekorativnye mnogoletniki (kratkie itogi introduktsii). M.: Izd-vo AN SSSR, 1960. 333 s.

Kabanov A. V. Perspektivnye pozdnostsvetutshie predstaviteli semejstva astrovye v kollektsiyakh otdela dekorativnykh rastenij Glavnogo botanicheskogo sada im. N. V. Tsitsina RAN // Subtropicheskoe i dekorativnoe sadovodstvo: sb. nauchn. tr. Sotchi: VNIITsISK, 2014. Vyp. 50. S. 96—100.

Katalog rastenij Glavnogo botanicheskogo sada imeni N. V. Tsitsina Rossijskoj akademii nauk. M.: Izd-vo MSKhA, 2001. 347 s.

Katalog tsvetotchno-dekorativnykh travyanistykh rastenij botanicheskikh sadov SNG i stran Baltii. Minsk: Izd. E. S. Galperin, 1997. 476 s.

Lapin P. I., Nekrasov V. I., Plotnikova L. S., Skvortsov A. K., Elajs T. S. Introduktsiya i okhrana rastenij v SSSR i SShA. M.: Nauka, 1986. 128 s.

Radionova E. S. Rastitelnyj pokrov Severnoj Ameriki kak istotchnik introduktsii dekorativnykh travyanistykh mnogoletnikov v Srednej polose Rossii. // Avtoref. kand. dis. M., 2003. 22 s.

Travyanistye dekorativnye mnogoletniki Glavnogo botanicheskogo sada im. N. V. Tsitsina RAN: 60 let introduktsii. M.: Nauka, 2009. 396 s.

Tsvetotchno-dekorativnye travyanistye rasteniya (kratkie itogi introduktsii). M.: «Nauka», 1983. 272 s.

Flora of North America: Volume 19: Magnoliophyta: Asteridae, Part 6: Asteraceae, Part 1. Oxford University Press, 2006. 610 p.

Flora of North America: Volume 20: Magnoliophyta: Asteridae, Part 7: Asteraceae, Part 2. Oxford University Press, 2006. 690 p.

Flora of North America: Volume 21: Magnoliophyta: Asteridae, Part 8: Asteraceae, Part 3. Oxford University Press, 2006. 642 p.

RHS Plant Finder 2012 – 2013. Royal Horticultural Society, London, 2012. 926 p.

Цитирование: Кабанов А. В. Формирование коллекции многолетних травянистых североамериканских представителей семейства *Asteraceae* в Главном ботаническом саду РАН // Hortus bot. 2017. Т. 12, 2017, URL: <http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=4262>.
DOI: [10.15393/j4.art.2017.4262](https://doi.org/10.15393/j4.art.2017.4262)

Cited as: Kabanov A. V. (2017). Formation of the collection of perennial herbaceous North American representatives of the aster family in the Main Botanical Garden of the Russian Academy of Sciences // Hortus bot. 12, 367 - 377. URL: <http://hb.karelia.ru/journal/article.php?id=4262>